











Formulaire description 2 / 8 (stade floraison)			Emplacement	V6R4231-35
Nom variété	Code	Observateur	Remarques	
Nom Accession Jubileum 75	Code 0 Mp 1661	Date 7/5/2018		

doctorioctorioctorioctori

BOURGEONNEMENT

	Code OIV	Descripteur	1	3	5	7	9
	001 = (2)	Ouverture extrémité	fermée	demi-ouverte	compl.ouverte		
	002	, ,		2- en lisere	3-partout		
-	003 = 4			faible	moyenne	forte	très forte
1	004 = 3	Densité des poils couchés de l'extrémité	nulle / très faible	faible	moyenne	forte	très forte
	005 = 5	Densité poils dressés de l'extrémité	nulle / très faible	faible	moyenne	forte	très forte

JEUNES FEUILLES (4ème feuille détachée)

1 4

Luntindanti adanti adanti adanti

051 = (6)	Couleur face supérieure limbe	1- verte	2- jaune	3- bronzées	4. cuivr-roug.	
	+ ocvv	vert-jaune	vert plag.antho	rg.cuivr.clair	rg.cuivr.clair	rg. vineux
053 = 7	Densité poils couchés entre nerv. principales face inf.	nulle / très faible	faible	moyenne	forte	très forte
054	Densité poils dressés entre nerv. principales face inf.	nulle / très faible	faible	moyenne	forte	très forte
055	Densité poils couchés sur nerv. principale face inf.	nulle / très faible	faible	moyenne	forte	très forte
056 = 8	Densité poils dressés sur nerv. principales face inf.	nulle / très faible	faible	moyenne	forte	très forte

RAMEAU HERBACE

006 = 9	Port	érigé	demi érigé	horizontal	demi-retomb	retombant	
351	Vigueur du rameau	très faible	faible	moyen	forte	très forte	
352	Croissance prompt-bourgeons	nulle / très faible	faible	moyenne	forte	très forte	
007 = 10	Couleur face dorsale entrenœuds	1- verte	2- verte et rouge	3- rouge			
009 = 12	Couleur face dorsale nœuds	1- verte	2- verte et rouge	3- rouge			
008 = 11	08 = 11 Couleur face ventrale entrenœuds		2-verte et rouge	3- rouge			
010 = 13	Couleur face ventrale nœuds	1- verte	2- verte et rouge	3-rouge			
014	Densité poils couchés entrenœuds	nulle / très faible	faible	moyenne	forte	très forte	
013	Densité poils couchés nœuds	nulle / très faible	faible	moyenne	forte	très forte	
012 = 14	Densité poils dressés entrenœuds	nulle / très faible	faible	moyenne	forte	très forte	
011	Densité poils dressés nœuds	nulle / très faible	faible	moyenne	forte	très forte	
015-2	Intensité pigm. anthocyan. écailles des bourgeons	nulle / très faible	faible	moyenne	forte	très forte	
016	Distribution vrilles	1- 2 ou moins	2 - 3 ou plus				
017 = 15	Longueur vrilles + valeur absolue (en cm) = 13	très courtes (<10 cm)	eourtes (15 cm)	moyennes (20 cm)	Longues (25 cm)	très longues (>30 cm)	
000-42	Relief surface du rameau herbacé	1- unie	2- côtelée				
000-10	Villosité spéciale du rameau herbacé	1- épines	2- p. massifs	3- aucune			
000-21	Couleur des vrilles	1- jaune	2- rouge clair	3- rg. fonce	4- vert		

INFLORESCENCE

151 = 16	Sexe de la fleur	1- mâle	2- mâle à herm.	3- hermaphrodite	4- femelle	
152	Niveau insertion 1° inflorescence	1- jusqu'au 2° noeud	2-3° et 4° nœud	3- à partir du 5° nœud		
153	Nombre inflorescence/rameau	1- 1 ou moins	2- 1,1 à deux	3- 2,2 à trois	4- plus de trois	
155	Fertilité bourgeons de la base	très faible		moyenne		t. élevée
501	Taux de nouaison	très faible (<10%)	faible (20%)	moyen (40%)	élevé (60%)	tr.élevé (=>80%)
000-43	Taille du bouton floral	1- petit	2- moyen	3- gros		
302	Epoque de floraison + date absolue =	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive

INRA Vassal

Codes OIV 2009
(= OCVV 2013)
Codes 000-internes

Virus ENR Virus CN Autre Mildiou Oïdium Botrytis Esca Eutypiose Excosiose Chlorose Carence Mg Autre